



## IMPFUNG GEGEN SAISONALE INFLUENZA – GRIPPEIMPFUNG

### DIE ERKRANKUNG

**Influenza** (die „echte Grippe“) wird durch Influenzaviren verursacht. Die „echte“ Grippe breitet sich von Mensch zu Mensch aus und wird sowohl durch Tröpfchen, die von einer infizierten Person über Niesen oder Husten verbreitet werden, als auch über die gemeinsame Berührung von Gegenständen (=Schmierinfektionen), übertragen. Wenige Stunden bis 3 Tage nach der Ansteckung können folgende Krankheitszeichen auftreten: Fieber, Halsschmerzen, Schnupfen, Trockener Husten, Müdigkeit, Kopf- und/oder Muskelschmerzen bzw. Gliederschmerzen. Es besteht ein Risiko für Folgekrankheiten wie Lungen- oder Herzmuskelentzündung, welche zum Tod führen können. Ein höheres Risiko für schwere Verläufe haben Säuglinge und Kleinkinder, Menschen ab 60 Jahren, Schwangere und Menschen mit chronischen Grunderkrankungen (z.B. Asthma, Diabetes mellitus, Herzerkrankungen, Adipositas usw.). Mehr als 60% aller Influenza-assoziierten Krankenhausaufnahmen und rund 90% der Todesfälle fallen in die Altersgruppe der Kinder und Älteren. Für die spezifische Behandlung der Influenza stehen Medikamente zur Verfügung (Neuraminidasehemmer), die besonders wirksam sind, wenn sie möglichst früh nach Erkrankungsbeginn genommen werden. Ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht für Gruppen mit hohem Personenkontakt. Die Influenza ist eine der bedeutendsten Infektionskrankheiten überhaupt und hat (im

Rahmen von Pandemien) bereits Millionen Menschen weltweit das Leben gekostet. Fast jedes Jahr kommt es auch in Österreich in den Herbst-/Wintermonaten zu einer Grippewelle, bei der sich 5-15 % der Bevölkerung anstecken und viele davon erkranken. Jährlich sterben rund 1000 Personen in Österreich an einer Ansteckung mit Influenzaviren. In der Influenzasaison 2017/2018 starben 9 Kinder in Österreich nachweislich an „echter Grippe“. Auch in der Saison 2018/2019 sind insgesamt mindestens 5 Todesfälle durch Influenza bei Kindern in Österreich aufgetreten. Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ist eine Influenza-Impfung auch in der kommenden Saison 2022/23 besonders wichtig, weil die Gefahr besteht, dass Grippeviren und das SARS-CoV-2-Virus gleichzeitig zu Erkrankungen führen. Es ist anzunehmen, dass die Influenzaerkrankung das Risiko für eine schwere COVID-19-Verlaufsform erhöht und umgekehrt. Sollten in der kommenden Influenza-Saison kontaktreduzierende Maßnahmen nicht im gleichen Umfang wie in der vergangenen Saison oder gar nicht mehr eingesetzt werden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im kommenden Jahr zu einer deutlich vermehrten Influenza-Aktivität kommt, weil der Anteil der Personen, welche – durch die COVID-bedingt ausgefallene Influenzasaison 2020/21 – keinen Kontakt zu Influenzaviren hatten, deutlich gestiegen ist.

### INFORMATIONEN ZUR IMPFUNG

#### Wer soll geimpft werden?

Die Impfung ist jeder Person, die sich schützen will, zu empfehlen. Die Impfung gegen die „echte“ Grippe ist ab dem 6. Lebensmonat möglich und besteht aus einer jährlichen Impfdosis. (*Ausnahme = Bei einer erstmaligen Impfung von Kindern bis zum vollendeten 9. Lebensjahr sollen für ein optimales Angehen 2 Impfungen im Abstand von mindestens 4 Wochen verabreicht werden*) Vorrangig empfohlen ist sie für Personen ab dem vollendeten 60. Lebensjahr, chronisch Kranke, Personen mit anderen Risikofaktoren (z.B. Schwangere) sowie Personal im Gesundheitswesen und in der Altenpflege.

#### Lokal- und Allgemeinreaktionen (Impfreaktion) nach der Impfung:

Grippeimpfstoffe sind in der Regel gut verträglich. Als vorübergehende Impfreaktionen können Schmerzen, Rötungen oder Schwellungen an der Einstichstelle auftreten. Bei allen Impfstofftypen können für meist ein bis zwei Tage erkältungsähnliche Beschwerden auftreten die folgenlos abklingen – also beispielsweise Fieber, Frösteln, Schwitzen, Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen oder Müdigkeit. Sie sind ein Zeichen dafür, dass sich der Körper mit dem Impfstoff „auseinandersetzt“ und Antikörper bildet. Es handelt sich dabei um eine normale sprich erwartbare Impfreaktion. Bei einer

Impfung mit dem Lebendimpfstoff (Nasenspray für Kinder) sind die am häufigsten beobachteten Reaktionen eine verstopfte oder laufende Nase. Bei diesem Impfstoff kann für wenige Tage nach der Impfung ein allgemeines Krankheitsgefühl wie bei einer Erkältung auftreten.

Wenn nach einer Impfung Symptome auftreten, welche die oben genannten vorübergehenden Lokal- und Allgemeinreaktionen überschreiten, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt/ Ihre Hausärztin.

**Bitte teilen Sie dem Impfarzt/der Impfärztin mit, wenn Sie an einer Allergie leiden!**

**Zum verwendeten Impfstoff beachten Sie bitte die beigelegte Gebrauchsinformation!**

#### An wen kann ich mich bei Fragen wenden?

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Bezirkshauptmannschaft oder an die Gesundheitsämter der Statutarstädte Linz, Steyr oder Wels, wo man Ihnen für einschlägige Fragen gerne zur Verfügung steht.

**Dr. Georg Palmisano**  
Landessanitätsdirektor