

Anlage 5
zur Verordnung der Oö. Landesregierung betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für bestimmte Federwildarten
(Oö. Federwildmanagementverordnung - Oö. FMVO)

Entnahmekontingent Graureiher

Graureiherkontingent

unter Berücksichtigung der Graureiherzählungen sowie Verteilung des Entnahmekontingents auf drei Brutregionen

Beurteilungsstufe	Beschreibung der Veränderung	Brutpaare (OÖ)	Entnahmausmaß	Graureiherkontingent	Kontingent (A,B)		Brutregion West (BR, GR, RI, RO, SD)	Brutregion Nord (EF, FR, LL, PE, UU, WL)	Brutregion Süd (GM, KI, SE, VB)
					A	B			
I	Wesentliche negative Veränderung	< 139	keine Entnahme	0	A	0		0	
					B	0	0	0	0
II	Geringfügige negative Veränderung	139-169	4 % vom Gesamtausfall = Kontingent	12	A	4		4	
					B	8	4	2	2
III	Keine wesentliche Veränderung	170-189	5 % vom Gesamtausfall = Kontingent	19	A	6		6	
					B	13	7	3	3
IV	Geringfügige positive Veränderung	190-219	6 % vom Gesamtausfall = Kontingent	27	A	8		8	
					B	19	11	4	4
V	Wesentliche positive Veränderung	> 219	7 % vom Gesamtausfall = Kontingent	35	A	10		10	
					B	25	15	5	5

Berechnungsmodell Graureiher	
Ausfall bei Gelege:	30 %
Geschlüpfte Jungvögel: erfolgreiche Gelege x durchschnittlich 5 Jungvögel	
Ausfall im Sommer des 1. Lebensjahres:	68 %
Ausfall im Herbst (1. Lebensjahr) und Frühjahr (2. Lebensjahr):	68 %
Ausfall adulter Graureiher: in % des adulten Frühjahresbestandes	68 %

Kontingentverteilung		
A	Gewässerstrecken mit besonderer ökologischer Funktion in Oberösterreich:	30 %
B	Teichanlagen:	70 %