

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВИВКЕ ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ

Заболевание и лечение:

Ранневесенний менинго-энцефалит это вирусное заболевание головного и спинного мозга. Это заболевание может оставлять тяжелые последствия, в некоторых случаях может быть смертельным. Передается через укусы клещей.

Клещи располагаются в основном в подлеске, кустах, а так же в высокой траве.

Оттуда клещи цепляются за одежду проходящих мимо людей или за шерсть животных.

Прививка против клещей рекомендована по всей Австрии.

Лечения этого заболевания не существует.

План прививок:

1. Первая прививка делается после первого полного года жизни (детям начиная с одного года)
2. Вторая прививка – через 2 недели – 3 месяца после первой
3. Третья – в течении 5-12 месяцев после второй
4. Четвертая часть – закрепление прививки – через 3 года, затем каждые 5 лет.

Людам от 60 лет – каждые 3 года.

Материал для прививки, ее действие, побочные эффекты:

99% всех людей, сделавших прививку защищены от заболевания. С помощью прививок стало возможным снизить количество заболевших.

Перед прививкой вы должны заполнить предложенный формуляр и ответить на вопросы.

Людам, имеющим тяжелую аллергию на куриный белок, прививка может быть сделана только в условиях стационара.

Часто встречающиеся побочные эффекты:

- болезненность места прививки
- головная боль
- усталость и слабость

Изредка встречающиеся побочные эффекты:

- опухание лимфатических узлов
- рвота
- повышенная температура
- синяк на месте прививки

Редко встречающиеся побочные эффекты:

- аллергическая реакция
- сонливость
- нарушение баланса
- понос, боли в животе
- покраснения, уплотнение тканей, припухлость, зуд
- заболевание головного и спинного мозга
- воспалительные заболевания мозга (энцефалит), судороги, воспаление головного и спинного мозга
- признаки раздражения головного или спинного мозга, как то боли, ригидность затылочных мышц
- неврологические жалобы, как то паралич лицевых мышц, параличи, воспаление нервов
- нарушение восприятия, как то покалывания или чувство онемения, воспаление глазного нерва
- головокружения
- нарушение или снижение зрения, болезненная реакция на свет, боли в глазах
- свист в ушах
- учащенное сердцебиение
- поверхностное дыхание
- кожная реакция (высыпания, зуд, дерматит, покраснение кожи, повышенное потоотделение, воспаление кожи)
- боли в спине, отеки суставов, боли в затылке, неподвижность мускулов и суставов, боли в конечностях)
- озноб, симптомы, похожие на грипп, общая слабость, отеки, неуверенная походка, ограниченность движений, воспаление в месте укола.